



POURQUOI UNE DOUCHE AVANT VOTRE INTERVENTION ?

La réalisation de **cette douche est une mesure nécessaire** destinée à améliorer la sécurité et la qualité des soins qui seront prodigués par l'équipe soignante.

Cette douche se prend avec le **savon** qui vous a été prescrit par votre chirurgien (savon doux ou savon antiseptique, selon indications de votre praticien à l'occasion de votre consultation).

Le savon doit être liquide, à usage unique ; à défaut, utiliser un nouveau flacon de savon.

COMMENT PRATIQUER LA DOUCHE PREOPERATOIRE ?

Pour une efficacité optimale, la douche préopératoire doit être pratiquée **la veille au soir et le matin** de l'intervention selon le protocole suivant :

- ⇒ Ne pas utiliser de gant de toilette, frotter directement avec les mains.
- ⇒ Si dépilation opératoire demandée par la chirurgien ne pas utiliser un rasoir mais plutôt une tondeuse ou une crème dépilatoire.



Enlever le vernis, couper et curer les ongles.
Enlever les bijoux et piercings.



Se mouiller le corps.



Appliquer le savon prescrit en commençant par les cheveux.



Faire mousser.



Laver le visage et le corps en insistant derrière les oreilles.



Insister sur les aisselles, le nombril, les plis de l'aîne et les pieds.



Savonner en dernier la région génitale, puis la région anale.



Rincer abondamment, toujours de haut en bas.




Recommencer les étapes de 3 à 8.



Se sécher avec une serviette propre, **mettre des vêtements propres**.

Sur le schéma ci-contre, votre praticien vous a précisé en couleur les zones à dépiler :



N° dossier : Code Ets : Date entrée :
 Nom, Prénom :
 Sexe : Nom de jeune fille :
 Date Naissance : N°JP :
 Service : Activité : Etage : Chambre :
 Médecin Responsable :

Pour tout renseignement complémentaire,
 n'hésitez pas à vous adresser
 l'équipe soignante
 ou au Chirurgien responsable de
 votre séjour.

J'atteste avoir pris connaissance de ces consignes et avoir pratiqué les douches préopératoires la veille au soir et le matin de l'intervention.

Date et signature du patient